

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Durante el manejo de este producto siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes de nitrilo, mascarilla, lentes de seguridad y botas de caucho.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”, “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”, “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”, “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”, “NO ALMACENE EN CASAS HABITACION”, “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”, “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”, “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”, “NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”, “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA”.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel o ropa: Quite la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua corriente y jabón.

En caso de contacto con los ojos: Mantenga los párpados bien abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos.

En caso de Ingestión: Enjuague la boca con agua limpia y consiga ayuda inmediatamente. Si la persona vomita, asegúrese de que las vías respiratorias estén libres de obstrucción. Succione cualquier secreción oral o nasal.

En caso de inhalación: Retire a la persona del lugar contaminado. Asegúrese que respire sin dificultad. Si no puede respirar acuéstelo de lado, retire secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire y dé respiración de boca a boca con un trapo de por medio.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo Químico: Estrobulurina

Antídoto: No existe antídoto específico.

Tratamiento: Proporcionar tratamiento sintomático y aplicar terapia de apoyo.

Signos y síntomas de Intoxicación: Por vía oral puede presentar náuseas, vómitos, diarrea, dificultad respiratoria, alteraciones nerviosas, fatiga, dolor de cabeza, mareos y temblores. Por vía dermal e inhalatoria puede producir irritación en piel, garganta y ojos.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”. “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”. “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”. “EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCA”.

“ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”.

GARANTÍA

SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., garantiza que el contenido del envase se encuentra conforme a la composición porcentual de esta etiqueta. Como el almacenamiento, uso, manejo, dosificación y aplicación del producto están fuera de nuestro control SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., el fabricante o vendedor no se hacen responsables de los resultados, daños especiales o indirectos que con este producto se pudieran obtener, ni se otra otorga garantía expresa o implícita.

“USO AGRÍCOLA”



FUNGICIDA / GRÁNULOS DISPERSABLES

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO

Azoxystrobin: Metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxil]-fenil}-3-metoxiacrilato
(Equivalente a 500 g de i.a./kg a 20°C) 50.00 %

INGREDIENTES INERTES

Humectante, dispersante, solubilizante-agente complejante, espesante, antiespumante y vehículo 50.00 %

No. DE REGISTRO: RSCO-FUNG-0386-X0113-034-050

CONTENIDO NETO:

500g



Nocivo si se inhala

Número de lote:

Fecha de caducidad:
2 años a partir de su elaboración.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Aguascalientes No. 115
Col. Roma Sur
CP 06760, Ciudad de México.
Tel.: 5366 5800 Fax: 5366 58 00



Sharda México

“HECHO EN INDIA”
“ENVASADO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

AZOSHY WDG es un fungicida sistémico de amplio espectro, formulado como Gránulos dispersables. Se recomienda su uso para el control de la enfermedad que se indica en los siguientes cultivos:

CULTIVOS	ENFERMEDAD	DOSIS (g/ha)	OBSERVACIONES
Jitomate (1) Tomate de cáscara (1) Chile (14)	Cenicilla del tomate (<i>Leveillula taurica</i>)	150 - 300	Realizar tres aplicaciones a intervalos de 7 días.

(1) Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 HORAS

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección puesto; abra cuidadosamente la bolsa apoyándose de unas tijeras. Vierta lentamente la cantidad recomendada de AZOSHY WDG en el tanque de aspersión con agua hasta la mitad de su capacidad, agitar continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, adicione la cantidad de agua restante para completar la capacidad del tanque y aplique de inmediato.

Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames. Volumen de aplicación 700 L/ha.

CONTRAINDICACIONES

Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hora) o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.

FITOTOXICIDAD

AZOSHY WDG no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar AZOSHY WDG con otros productos. Sin embargo, si se desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para los cultivos recomendados en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación.

“MANEJO DE LA RESISTENCIA”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”



PRECAUCIÓN

