

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Siempre lea la etiqueta del producto. Durante su aplicación y manejo use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga, pantalón largo, guantes, lentes de seguridad, gorra mascarilla provista de filtro y botas. Constatar el estado del equipo de aplicación al inicio de cada jornada. Por ningún motivo aplique con equipo en malas condiciones. Lavar aparte la ropa y el equipo usado. Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado; bajo llave.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”, “NO SE TRANSPORTE NI , ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FARRAJES”, “MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS”, “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”, “NO ALMACENE EN CASAS HABITACION”, “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”, “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”, “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”, “NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”, “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”, “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA”.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto, si la víctima no respira proporcione de inmediato respiración de boca a boca poniendo un trapo limpio de por medio y obtenga atención médica. Si hubo contacto con la piel, quite inmediatamente la ropa contaminada y lave la parte afectada con agua y jabón durante 15 minutos. Si ha habido contacto con los ojos enjuáguelos con abundante agua corriente por lo menos durante 15 minutos. Si el producto fue ingerido el producto y la persona ésta consciente de a beber agua, no provoque el vómito, consiga atención médica inmediatamente. Si la persona está inconsciente, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Llame inmediatamente al médico.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo Químico: Estrobilurina (Azoxystrobin) y Triazol (Difenoconazole)

Síntomas de intoxicación: Podría presentarse diarrea, vómito o náuseas

Tratamiento y antídoto: No posee antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CAÑALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”, “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”, “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”, “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”, “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: “ESTE PRODUCTO ES MODERADAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, NO LO “APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO”.

GARANTÍA

SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual de esta etiqueta y que el producto es razonablemente adecuado para los propósitos descritos en las Instrucciones de Uso de esta misma etiqueta. Debido a que el almacenamiento, uso, manejo o disposición del producto entre otros, están fuera de nuestro control. SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., el fabricante o vendedor no se hacen responsables de los resultados, daños especiales o indirectos que con este producto se pudieran obtener, ni se otra otorga garantía expresa o implícita sobre su capacidad de comerciabilidad.

“USO AGRÍCOLA”



FUNGICIDA / SUSPENSIÓN CONCENTRADA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO % EN PESO

Azoxystrobin: Metil (E)-2 {2-[6-(2-cianofenoxy)-pirimidin-4-iloxil] fenil}-3-metoxiacrilato (Equivalente a 224g de i.a./L a 20°C) NO MENOS DE: 20.00 %

Difenoconazole: 3-cloro-4-[(2RS,4RS:2RS,4RS)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-2-il]fenil 4-clorofenil éter (140 g de i.a./L a 20°C) NO MENOS DE: 12.50 %

INGREDIENTES INERTES

Dispersante, solvente, anticongelante, antiespumante, espesante NO MAS DE: 67.50 %

No REGISTRO: RSC0-MEZC-FUNG-1301R-X0020-064-32.50

CONTENIDO NETO:

1L



Nocivo si se inhala

Fecha de fabricación y número de lote:

Fecha de caducidad: 2 años a partir de su elaboración.

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADO

Y DISTRIBUIDO POR:

SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Aguascalientes No. 115

Col. Roma Sur

CP 06760, Ciudad de México.

Tel.: 5366 5800 Fax: 5366 58 00



Sharada México

HECHO EN INDIA

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO” “SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

DIFAZ es un fungicida recomendado en los siguientes cultivos para control de enfermedades indicadas a continuación:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
CEBADA (30 días)	ROYA AMARILLA <i>Puccinia striiformis</i> <i>Westend</i> ESCALDADURA <i>Rhynchosporium secalis</i>	0.3-0.5 L/ha	Aplicar cuando se detecten las condiciones apropiadas para el desarrollo de la enfermedad y/o se detecten los primeros síntomas de la enfermedad.

() INTERVALO DE SEGURIDAD = Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha
Tiempo de reentrada: No permita la entrada a las áreas tratadas hasta después de transcurridas 12 horas de aplicado el producto

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agite el producto. El envase debe ser abierto embonando la parte superior de la tapa con la abertura del mismo. Girar presionando ligeramente hasta que el sello se rompa por completo al nivel del contorno de la boca del envase.

Agregue agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de aspersión y vierta lentamente la cantidad recomendada del producto, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, adicione el agua restante para completar la capacidad del tanque. Aplique de inmediato. Cada vez que llene la aspersora, deberá agitar antes la mezcla preparada. Aplicar el producto con suficiente agua (300 L/ha) para obtener una cobertura completa del cultivo.

CONTRAINDICACIONES

Evitar la aplicación con vientos superiores a los 10 km/hora. No aplicar en horas de calor intenso.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



PRECAUCIÓN

